



Tác Dụng

Medetomidine được coi là mạnh hơn và có tác dụng lâu hơn so với xylazine, một chất an thần khác cũng có trong fentanyl.

Những Điều Cần Lưu Ý

- Nếu quý vị có những triệu chứng này, hãy tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay lập tức. Hãy yêu cầu được xét nghiệm medetomidine để họ có thể điều trị cho quý vị.

- Tập trung vào việc hô hấp nhân tạo và đảm bảo ngực của người đổ phồng lên và xẹp xuống. Chờ ít nhất 3 phút trước khi cho dùng liều naloxone tiếp theo. Luôn gọi 911 nếu có thể.

- Vì medetomidine là chất an thần mạnh nên tình trạng quá liều có thể khó hồi phục hơn. Người bị quá liều có thể chỉ bắt đầu thở lại một chút và vẫn trong trạng thái lơ mơ, vì vậy điều quan trọng là phải tiếp tục theo dõi họ.

- Cho dùng naloxone và hô hấp nhân tạo, nhưng cũng cần tìm sự trợ giúp để đảm bảo người đó được an toàn.

Các Nguồn Lực về An Toàn

Các Tổ Chức Giảm Thiểu Tác Hại: Hiện đã có các que thử phát hiện medetomidine. Nếu quý vị lo ngại về thành phần trong loại ma túy của mình, hãy liên hệ với chương trình giảm thiểu tác hại tại địa phương để biết thông tin về các dịch vụ kiểm tra ma túy hoặc truy cập info.streetcheck.org/madds

Đường Dây Nóng SafeSpot: SafeSpot là đường dây nóng ẩn danh do những người có cùng trải nghiệm điều hành, quý vị có thể gọi bất cứ lúc nào và sẽ có người túc trực để theo dõi quý vị khi quý vị sử dụng một mình. Gọi (800) 972-0590 hoặc truy cập [safe-spot.me](https://www.safe-spot.me)

Mang Theo Naloxone: Tiếp nhận naloxone tại YouCan [youcan.info]. Để biết các nguồn lực khác, hãy truy cập www.mass.gov/naloxone.

Điều quan trọng là phải biết các loại ma túy có chứa medetomidine hay không để quý vị có thể chuẩn bị và giữ an toàn cho bản thân.

Kiểm tra xu hướng nguồn cấp ma túy tại địa phương theo địa chỉ
www.streetcheck.org.