



ការជូនដំណឹងអំពីការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំមេដេចូម៉ែដិន



ថ្នាំមេដេចូម៉ែដិន (MEH-deh-TOH-mih-deen)

មេដេចូម៉ែដិនគឺជាថ្នាំរំលោភបំពានដែលត្រូវបានលាយជាមួយ fentanyl (ហ្វីនតានីល)។ វាត្រូវបានរកឃើញក្នុងតំបន់ Philadelphia ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ 2024។ តាំងពីរដូវក្តៅឆ្នាំ 2024 វាត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts។ នៅខែមិថុនា ឆ្នាំ 2025 ថ្នាំមេដេចូម៉ែដិន បានបង្ហាញនៅក្នុងតំបន់ព្រំប្រទល់ស្រុកក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ភាគកណ្តាល និងភាគខាងលិច មានកម្រិតខ្ពស់ បំផុតនៅក្នុងថ្នាំដែលបានសាកល្បង

អ្នកប្រើពឹងរង់ចាំ

ប្រតិកម្ម៖ប្រជាជនដែលប្រើឱសថដែលមានមេដេចូម៉ែដិនជាញឹកញយ អាចធ្លាក់ខ្លួនទៅពឹងពាក់ទៅលើវា។ ប្រសិនបើពួកគេឈប់ប្រើថ្នាំមេដេចូម៉ែដិន ពួកគេអាចឆ្លងកាត់នឹងប្រតិកម្ម។ ប្រតិកម្មនឹងថ្នាំមេដេចូម៉ែដិនអាចធ្ងន់ធ្ងរ។ វាអាចចាប់ផ្តើមយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅរកជីវិត។ វាអាចបណ្តាលឱ្យបេះដូងមានដំណើរលឿន សម្ពាធឈាមខ្ពស់ ឈឺក្បាល ប្រកាច់ ឬញ័រ មានអារម្មណ៍ចង់បោក ឬតូចចិត្ត ឬឃើញរបស់ដែលមិននៅទីនោះ។ ប្រជាជនខ្លះអាចត្រូវការទៅមន្ទីរពេទ្យ ដើម្បីកាត់បន្ថយអារម្មណ៍បែបនោះ។

- ប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញាទាំងនេះ ស្វែងរកជំនួយខាងវេជ្ជសាស្ត្រមួយរំពេច។
ស្នើសុំការធ្វើតេស្តសម្រាប់មេដេចូម៉ែដិន ដើម្បីពួកគេអាចជួយដល់អ្នក។

ការប្រើប្រាស់ថ្នាំលើសពីកម្រិតនិងការរំលោភបំពានអារម្មណ៍៖

ថ្នាំ មេដេចូម៉ែដិន មិនមែនជាថ្នាំអាភៀនទេ ប៉ុន្តែវាត្រូវបានគេរកឃើញជាញឹកញាប់ជាមួយ ហ្វីនតានីល) ដូច្នេះការផ្តល់ណាឡូសូន (Narcan) សម្រាប់ការប្រើប្រាស់គឺនៅតែត្រូវបានណែនាំ។

- ផ្ដោតទៅលើការស្រាវជ្រាវដើម ហើយបញ្ជាក់ថាទ្រង់របស់ជនឡើងនឹងចុះ។ រង់ចាំយ៉ាងហោចណាស់ 3 នាទីមុននឹងផ្តល់ណាឡូសូន មួយដូសទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើបាន សូមទូរស័ព្ទទៅ 911 ជានិច្ច។
- ដោយសារតែថ្នាំ មេដេចូម៉ែដិន គឺជាថ្នាំរំលោភបំពានអារម្មណ៍ខ្លាំងក្លា វាអាចធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់ថ្នាំហួសកម្រិតពិបាកនឹងបញ្ជាក់សមភាព។ មនុស្សម្នាក់ប្រហែលជាចាប់ផ្តើមដកដង្ហើមបន្តិចៗ ហើយនៅភ្ញាក់បន្តិច ដូច្នេះវាជាការសំខាន់ក្នុងការបន្តមើលពួកគេ។
- ផ្តល់ថ្នាំ ណាឡូសូន និងដង្ហើមសង្គ្រោះ ប៉ុន្តែកុំទទួលបានជំនួយផងដែរ ដើម្បីប្រាកដថាអ្នកដទៃមានសុវត្ថិភាព។

ផលប៉ះពាល់

ថ្នាំ មេដេចូម៉ែដិន អាចបណ្តាលឱ្យងងុយដកខ្លាំង មាត់ស្ងួត ដកដង្ហើមយឺត ចង្វាក់បេះដូងទាប និងសម្ពាធឈាម រមួលសាច់ដុំ និងសូម្បីតែការយល់ច្រលំ។

ថ្នាំ មេដេចូម៉ែដិន ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាខ្លាំងជាង និងប្រើប្រាស់បានយូរជាង xylazine (សាលឡាស៊ីន) ដែលជាសារធាតុរំលោភបំពានអារម្មណ៍ មួយផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគេឃើញនៅក្នុង ហ្វីនតានីល) ផងដែរ។

អ្នកដែលបានប្រើហ្វីនតានីល) ជាមួយ មេដេចូម៉ែដិន បាននិយាយថាពួកគេ៖ "សន្លប់ភ្លាមៗ កម្រើកបានបន្តិចបន្តួច ដកដង្ហើមយឺត មាត់ស្ងួត ប្រើប្រាស់"។ បទពិសោធន៍ដទៃទៀតគឺ៖ "ការឆាប់ខឹង / រំជើបជួលខ្លាំង ការស្តាប់អ្វីដែលមិននៅទីនោះ" ។

ធនធានសុវត្ថិភាព

អង្គការកាត់បន្ថយភាពគ្រោះថ្នាក់៖

បន្ទះសាកល្បងដែលប្រើថ្នាំ មេដេចូម៉ែដិន មាន។ ប្រសិនបើ

អ្នកមានការព្រួយបារម្ភអំពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងថ្នាំរបស់អ្នក សូមទាក់

ទងកម្មវិធីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ក្នុងតំបន់របស់អ្នក សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីសេវាកម្មត្រួតពិនិត្យឱសថ

ឬចូលទៅកាន់ info.streetcheck.org/madds

បណ្តាញ SafeSpot៖

Safepot

គឺជាបណ្តាញទូរស័ព្ទបន្ទាន់

អនាមិកដែលដំណើរការដោយមិត្តភក្តិ ដែល

អ្នកអាចហៅបានគ្រប់ពេល

ហើយនរណាម្នាក់នឹងបន្តតាមដានអ្នកនៅពេល

ប្រើតែម្នាក់ឯង។ សូមទូរស័ព្ទ (800) 972-0590

ឬចូលទៅ safe-spot.me

Carry Naloxone៖

ទទួលបានណាឡូសូននៅ YouCan

[youcan.info]។ សម្រាប់ធនធានដទៃទៀត

សូមចូលទៅ www.mass.gov/naloxone.

វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវដឹងថាគេ ថ្នាំមានផ្ទុកសារធាតុមេដេចូម៉ែដិនដូច្នេះ អ្នកអាចរៀបចំនិងមានសុវត្ថិភាព។ ពិនិត្យមើលនិន្នាការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំក្នុងស្រុក នៅ www.streetcheck.org.