



# Alerta sobre Drogas Contendo Medetomidina



## Medetomidina (Me-de-to-mi-dí-na)

Medetomidina é um sedativo que está sendo misturado ao fentanil. Foi encontrada pela primeira vez na área de Philadelphia em abril de 2024. Desde o verão de 2024, ela também vem sendo encontrada em Massachusetts. Em junho de 2025, a medetomidina foi detectada em amostras de drogas de todos os condados do estado. As amostras de drogas da Região Central e da Região Oeste de Massachusetts apresentam os níveis mais altos de medetomidina.

## Com que você deve ficar alerta

**Crise de abstinência:** As pessoas que usam drogas contendo medetomidina com frequência pode tornar-se dependentes de medetomidina. Se pararem de usar medetomidina, podem ter uma crise de abstinência. Uma crise de abstinência de medetomidina pode ser grave. Ela também pode começar muito rapidamente. Pode causar batimento cardíaco acelerado, pressão arterial alta, dores de cabeça, convulsões ou tremores, sentimentos de grande ansiedade ou estresse, e pode fazer com que a pessoa veja coisas que não existem. Algumas pessoas podem precisar ir a um hospital para poderem melhorar.

- Se você apresentar esses sintomas, procure cuidados médicos imediatamente. Peça para que façam um teste de medetomidina para que possam dar a você o tratamento adequado.

**Overdose e sedação:** A medetomidina não é um opioide, mas é frequentemente encontrada em fentanil, portanto ainda recomendamos que seja dada naloxona (Narcan) no caso de overdose.

- O foco deve ser em respiração de resgate e em verificar se o peito da pessoa está se enchendo e esvaziando. Aguarde pelo menos 3 minutos antes de dar outra dose de naloxona. Sempre ligue para o 911, se puder.
- Como a medetomidina é um sedativo forte, ela pode fazer com que a reversão da overdose seja mais difícil. A pessoa pode apenas começar a respirar um pouco e estar levemente consciente, portanto, é importante continuar a observá-la.
- Dê naloxona e faça respiração de resgate, mas busque ajuda também, para se certificar que a pessoa está livre de perigo.

## Efeitos

A medetomidina pode causar sonolência excessiva, boca seca, respiração lenta, batimento cardíaco lento, pressão arterial baixa, espasmos musculares e até mesmo alucinações.

A medetomidina é considerada mais forte, e tem efeitos mais duradouros, do que a xilazina, que é outra substância sedativa também encontrada no fentanil.

As pessoas que usam fentanil com medetomidina relatam que: “perderam a consciência instantaneamente; quase não conseguiam se mover, começaram a respirar lentamente, ficaram com a boca seca e tiveram uma overdose”. Outras coisas que relataram: “irritabilidade excessiva/agitação, escutar coisas que não existem”.

## Recursos para segurança

### Organizações para redução de danos à saúde:

Existem tiras de teste para a detecção de medetomidina. Se você estiver preocupado com o que pode estar em suas drogas, conte seu programa de redução de danos à saúde para obter informações sobre os serviços de análise de drogas ou acesse [info.streetcheck.org/madds](http://info.streetcheck.org/madds)

**Linha Direta da SafeSpot:** A SafeSpot é uma linha direta anônima atendida por pessoas como você para onde você pode ligar a qualquer hora e ter alguém para ficar na linha com você, se estiver usando sozinho e precisar de ajuda. Ligue para (800) 972-0590 ou acesse [safe-spot.me](http://safe-spot.me)

**Tenha naloxona com você:** Obtenha naloxona em YouCan [[youcan.info](http://youcan.info)]. Para encontrar outros recursos, acesse [www.mass.gov/naloxone](http://www.mass.gov/naloxone).

**É importante saber se as drogas contêm medetomidina para que você possa se preparar e permanecer em segurança.**

**Verifique as tendências dos suprimentos de drogas locais em [www.streetcheck.org](http://www.streetcheck.org).**